

ASSAIL®

ACETAMIPRID 70% WP

USO: insecticida

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Cada sobre de aluminio contiene un sobre hidrosoluble. Abra este sobre de aluminio e introduzca el sobre hidrosoluble de 100 g en un tanque de 2000 L. Para la dosis de 5 g/hl, diluir el contenido de un sobre (100 g) en 2000 L de agua.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Aplicar con equipos terrestres como mochilas manuales o a motor, procurando una cobertura uniforme del cultivo prestando especial atención de cubrir hojas y frutos. Parámetros a considerar: Cobertura 50 a 70 gotas/cm³; Tamaño de gota: 200 a 400 micrones. Uniformidad: 10 a 20% de coeficiente de variación.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plagas	Dosis	TC	Momento de aplicación
Manzano	<i>Carpocapsa</i> (<i>Cydia pomonella</i>)	3.5 a 5 g/hl	1	Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos, con un intervalo de 14 días. Utilizar la dosis alta cuando la presión de la plaga sea alta.
	<i>Chicharrita amarilla</i> (<i>Edwardsiana crataegi</i>)	3.5 g/hl		Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5% de las hojas. Repetir el tratamiento según recomendación de su Ingeniero Agrónomo.
Peral	<i>Carpocapsa</i> (<i>Cydia pomonella</i>)	3.5 a 5 g/hl		Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos, con un intervalo de 14 días. Utilizar la dosis alta cuando la presión de la plaga sea alta.
	<i>Psílido del Peral</i> (<i>Cacopsyla pyricola</i>)	3.5 g/hl		Aplicar el producto al observar la presencia de las primeras ninfas y sea evidente la producción de melaza.

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719, Piso 8 (C1009ABO) Bs. As. Argentina

Tel: 0810 - 333 - Summit (786648)

UNA EMPRESA DEL GRUPO SUMITOMO CORP.

Be Green
TecNología



Para garantizar los Límites Máximos de Residuos (LMR) de 0.7 ppm, se recomienda realizar solo una aplicación de ASSAIL en el último día previo a la cosecha.

RESTRICCIONES DE USO:

Período de carencia: para manzana y pera, realizar la última aplicación 1 día antes de la cosecha.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 Hs.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:

ASSAIL es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de limón, manzano, pera y tomate; sin embargo se recomienda realizar una prueba de fitocompatibilidad química y biológica de cualquier mezcla que se intente hacer, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

FITOTOXICIDAD:

No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.

Carlos Pellegrini 719, Piso 8 (C1009ABO) Bs. As. Argentina

Tel: 0810 - 333 - Summit (786648)

UNA EMPRESA DEL GRUPO SUMITOMO CORP.

Be Green
TecNología

