

FICHA DE TRANSPORTE PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA		
Clase 9 Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente. No inflamable N° ONU 3082 Grupo de embalaje III	SUMILEX 50	N° de ficha 31.460 <i>S. Ando & Cia. S. A.</i>
	PRINCIPIO ACTIVO: Procimidone 50 % SENASA N° 31.460 CARACTERÍSTICA: Actúa inhibiendo la germinación de las esporas y bloqueando el desarrollo del micelio, incluso a las formas resistentes a bencimidazoles.	Uso Fungicida Polvo soluble
EN CASO DE ACCIDENTE LLAMAR A ESTOS TELEFONOS LAS 24hs.		
TAS - Toxicología, Asesoramiento y Servicios. Tucumán 1544 (2000) Rosario		(0341) 424 – 2727
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" S. de Bustamante 1399 (1425) Buenos Aires		(011) 4962 - 6666 / 2247 Fax (011) 4962 - 3762
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico "Prof. A. Posadas" Av. P. Illía y Marconi (1706) Buenos Aires		(011) 4654 - 6648 (011) 4658 - 7777 [0800-333-0160]
Brigada de Riesgos Especiales de Bomberos de la Policía Federal Argentina		(011) 4644 2792 / 5
S. ANDO & CIA S.A. Defensa 540 - CABA (1065AAJ)		(011) 4342-4459
MEDIDAS GENERALES: Ubicar el vehículo fuera de la ruta para evitar mayores accidentes. Tener en cuenta la dirección del viento. "PELIGRO DE INTOXICACION". Parar el motor. No fumar. Evitar que el producto llegue a desagües o cursos de agua. Llamar a la Policía o Bomberos de la Población más cercana.		
INCIDENTE SIN INCENDIO Retirar los recipientes dañados. Contener el derrame con tierra, arena o aserrín. Recoger las pérdidas y recurrir a expertos para la destrucción del producto. Equipo de Protección: Aparato respiratorio autónomo. Mascaras.		INCIDENTE CON INCENDIO Extinguir con: AGUA - ESPUMA UNIVERSAL - POLVO SECO - DIOXIDO DE CARBONO. Equipo de Protección: Aparato respiratorio autónomo. Trajes adecuados.
NOTA AL MÉDICO	Clase IV (Producto que normalmente no ofrece peligro) APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.	
	INHALACIÓN:	Retirar al aire fresco. Si es necesario efectuar respiración artificial. Dar oxígeno. Llamar al médico.
TRATAMIENTO	PIEL:	Lavar con abundante agua y jabón. Llamar al médico.
	OJOS:	En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua o solución fisiológica por espacio de 10 a 15 minutos. Mantener los párpados separados durante el procedimiento y consultar inmediatamente a un oftalmólogo..
	INGESTION:	No inducir al vómito. No administrar nada por boca si está inconsciente. Llamar al médico.